

El futuro del trabajo en una pandemia prolongada

Dr. Martín Maillo

Especialista en Neumonología


Especialista en Alergia

Médico del Trabajo



Definición de caso confirmado

Criterio 1:

- Fiebre (37.5°C o más)
- Tos
- Dolor de garganta
- Dificultad respiratoria
- Perdida repentina del gusto o del olfato
- Cefalea
-  Diarrea y/o vómitos

Persona con síntomas compatibles de infección por SARS-Cov-2
+
Hisopado confirmatorio de la infección




Persona con síntomas compatibles de infección por SARS-Cov-2
+
Conviviente de una persona confirmada de infección por SARS-CoV-2
(No requiere hisopado)

Persona que presenta alteración del olfato y/o gusto, sin otra causa que lo justifique
(No requiere hisopado)

sintomático



Aislamiento




hisopado y
Seguimiento

Contacto de
caso positivo





- No se hisopa
- Seguimiento

Contacto de
caso Negativo



Caso confirmado



contactos estrechos



Aislamiento



Seguimiento

- Menos de 2 metros
- Mas de 15 minutos
- Sin protección respiratoria

10 días
Desde el inicio
de los síntomas

- Control de síntomas
- Controles médicos a domicilio
- Derivación para internación

Caso positivo en el lugar de trabajo

Limpieza del lugar de trabajo



Evaluar posibles contactos
En el lugar de trabajo



Notificar:

- Autoridad de salud
- Recursos Humanos
- ART

Denuncia a la ART.

- Considerar claramente el “relato” en la denuncia.
 - Atención con los días previos
 - Registrar los testigos si los hubiera.
- Tener bien registrada la entrega y uso de los EPP.
- Tener un protocolo de prevención y manejo de casos de Covid-19
- Casos positivos confirmados (todos debo denunciar?)

Alternativas preventivas a largo plazo

- Trabajo en esquema de “burbujas”
- “Mapeo” continuo de infección
- Organizar los grupos de trabajo de acuerdo a antecedentes (ya contagiados y no contagiados)
- Vacunación




Burbujas sociales



“Mapeo” de infección.

- Realizar “mapeo” de infección.
 - Actual
 - Antígenos
 - PCR
 - Pasada
 - Anticuerpos



Organizar los grupos de trabajo de acuerdo a antecedentes (ya contagiados con no contagiados)



Es posible la re infección?

Vacunas contra SARS-CoV-2



El proceso de vacunación



Preguntas

Muchas gracias

martinmaillo05@yahoo.com.ar